arXiv:1207.5668v1 [math.DG] 24 Jul 2012

Cohomologie L^p en degré 1 des espaces homogènes *

Pierre Pansu[1,2†]

25 juillet 2012

RESUME. On calcule la cohomologie L^p en degré 1 des espaces homogènes riemanniens. Notamment, on montre que la cohomologie réduite est non nulle si et seulement si l'espace est quasiisométrique à un espace homogène à courbure sectionnelle strictement négative.

ABSTRACT. The L^p-cohomology in degree 1 of Riemannian homogeneous spaces is computed. It turns out that reduced cohomology does not vanish exactly for spaces quasiisometric to negatively curved homogeneous spaces.

1 Introduction

L'objet de ce papier est de calculer dans des exemples, en employant des outils d'analyse, un invariant d'inspiration topologique, utile en théorie géométrique des groupes, la cohomologie L^p en degré 1.

1.1 Cohomologie L^p

Définition 1 *Soit $p \geq 1$. La cohomologie L^p en degré 1 d'une variété riemannienne M, notée $H^{1,p}(M)$, est le quotient de l'espace des 1-formes fermées L^p par le sous-espace des différentielles des fonctions L^p à gradient L^p. Autrement dit, $H^{1,p}(M) = 0$ si et seulement si toute fonction sur M dont le gradient est L^p est elle-même L^p à une constante additive près. Les classes des 1-formes qui sont limites L^p de différentielles de fonctions L^p forment un sous-espace de $H^{1,p}(M)$ appelé* torsion *et noté $T^{1,p}(M)$. Le quotient $H^{1,p}(M)/T^{1,p}(M) = R^{1,p}(M)$ (plus grand quotient séparé de $H^{1,p}(M)$) s'appelle la* cohomologie L^p réduite.

Lorsque M est compacte, $H^{1,p}(M)$ est simplement le premier espace de cohomologie de de Rham de M. Dans cet article, on calcule $H^{1,p}(M)$ lorsque M est homogène non compacte. Voici deux cas extrêmes, classiques.

Exemple. La droite réelle. Dans ce cas, $R^{1,p}(M) = 0$ et $T^{1,p}(M) \neq 0$. En effet, il existe des fonctions L^p sur $\mathbf{R}$ dont les primitives ne sont pas L^p, mais toute fonction L^p est limite L^p de fonctions à support compact, d'intégrale nulle, qui admettent une primitive à support compact (donc L^p).

Exemple. Le plan hyperbolique. Dans ce cas, $T^{1,p}(M) = 0$ et $R^{1,p}(M) \neq 0$. L'annulation de la torsion résulte de l'inégalité isopérimétrique linéaire : l'aire d'un domaine du plan hyperbolique est inférieure à la longueur de son bord. Lorsque $p = 2$, la cohomologie réduite est représentée par des 1-formes harmoniques L^2. Leurs primitives possèdent des valeurs au bord, des fonctions sur le cercle qui appartiennent à l'espace de Sobolev $H^{1/2}$. Plus généralement, pour tout $p > 1$, $R^{1,p}(M)$ est isomorphe à l'espace de Besov $B^{p,p}_{1/p}$ du cercle, quotienté par les fonctions constantes, voir [T].

*Mots clé : Cohomologie L^p, courbure négative, espace homogène, espace de Besov. Keywords : L^p-cohomology, negative curvature, homogeneous space, Besov space. Mathematics Subject Classification : 43A15, 43A80, 46E35, 53C20, 53C30, 58A14.

†[1] Univ Paris-Sud, Laboratoire de Mathématiques d'Orsay, Orsay, F-91405 ;
[2] CNRS, Orsay, F-91405.

La droite réelle illustre le cas particulier des espaces homogènes *fermés à l'infini*, i.e. pour lesquels l'inégalité isopérimétrique linéaire est en défaut, voir Définition 9. Ces espaces ont été caractérisés par H. Hoke, [Ho]. Le plan hyperbolique illustre une autre famille particulière, celle des espaces homogènes à courbure sectionnelle négative. Ces espaces ont été caractérisés par E. Heintze, [He]. Le résultat principal de cet article est le fait que dans le cas général, i.e. avec pour seules exceptions ces deux familles, la cohomologie L^p en degré 1 est nulle. En particulier, les espaces homogènes possédant des fonctions harmoniques non constantes dont le gradient est L^p sont rares.

1.2 Le résultat

Remarquer que l'espace $H^{1,p}(M)$ ne change pas si on change de métrique riemannienne sur M, pourvu qu'elle reste bornée par rapport à la métrique initiale (plus généralement, $H^{1,p}(M)$ est un invariant de quasiisométrie, voir au paragraphe 2.1). Par conséquent, si M est homogène, $H^{1,p}(M)$ ne change pas si on change de métrique riemannienne sur M, pourvu qu'elle reste invariante par un groupe cocompact d'isométries. Plus généralement, c'est un invariant de commensurabilité.

Définition 2 *On dit que deux groupes de Lie connexes G et G' sont commensurables s'il sont dans la même classe pour la relation d'équivalence engendrée par les relations suivantes.*
- *G est isomorphe à un sous-groupe fermé, connexe et cocompact de G'.*
- *$G' = G/K$ est le quotient de G par un sous-groupe compact distingué.*

On dit que deux espaces homogènes riemanniens M et M' sont commensurables *si les composantes neutres de leurs groupes d'isométries le sont.*

Théorème 1 *Soit M un espace homogène riemannien non compact. Alors la cohomologie L^p en degré 1 de M est nulle, sauf si M est fermé à l'infini ou à courbure négative. Plus précisément,*

1. *ou bien le groupe d'isométries de M est une extension compacte d'un groupe de Lie résoluble unimodulaire. Dans ce cas, pour tout $p > 1$, $T^{1,p}(M) \neq 0$.*
2. *ou bien M est commensurable à un espace homogène à courbure sectionnelle strictement négative. Dans ce cas, $T^{1,p}(M) = 0$ pour tout $p \geq 1$. De plus, il existe un nombre $\mathbf{p}(M) \geq 1$ tel que $H^{1,p}(M) = 0$ si $p \leq \mathbf{p}(M)$ et $R^{1,p}(M) \neq 0$ si $p > \mathbf{p}(M)$.*
3. *sinon, $H^{1,p}(M) = 0$ pour tout $p > 1$.*

Pour un espace homogène à courbure strictement négative, le nombre $\mathbf{p}(M)$, qui sera explicité dans la Proposition 24, peut s'interpréter comme la dimension de Hausdorff du bord à l'infini, voir [P2]. Il vaut au moins 2, sauf pour le plan hyperbolique.

Corollaire 3 *Soit M un espace homogène riemannien non compact. Si M possède des fonctions harmoniques non constantes dont le gradient est L^2, il est commensurable (et donc quasiisométrique) au plan hyperbolique.*

Dans la classe plus restreinte des espaces symétriques riemanniens, ce résultat est dû à A. Borel, [Bo].

Un résultat récent de R. Tessera [Te] affirme que, pour un groupe de Lie résoluble unimodulaire, $R^{1,p}(M) = 0$. Cela permet de compléter le théorème 1 comme suit. *Pour un espace homogène riemannien, on a la trichotomie suivante.*

1. *ou bien, pour tout $p > 1$, $R^{1,p}(M) = 0$ et $T^{1,p}(M) \neq 0$.*
2. *ou bien, pour tout $p > 1$, $T^{1,p}(M) = 0$, et il existe un nombre $\mathbf{p}(M) \geq 1$ tel que $R^{1,p}(M) \neq 0 \Leftrightarrow p > \mathbf{p}(M)$.*
3. *ou bien, pour tout $p > 1$, $H^{1,p}(M) = 0$.*

1.3 Schéma de la preuve

1. Par commensurabilité, on se ramène au cas des groupes de Lie résolubles connexes G munis de métriques riemanniennes invariantes à gauche.
2. Si G est unimodulaire, alors, d'après un résultat de H. Hoke [Ho], il est fermé à l'infini, donc, d'après un principe qui remonte à H. Kesten [K], la torsion L^p est non nulle pour tout $p \geq 1$.
3. Si G n'est pas unimodulaire, on choisit un sous-groupe à un paramètre $t \mapsto g_t$ qui augmente le volume. En s'inspirant de R. Strichartz, [S], on montre que, pour toute fonction u sur G dont le gradient est L^p, la limite $u_\infty(x) = \lim_{t\to+\infty} u(xg_t)$ existe pour presque tout x, et que $u \in L^p$ si et seulement si u_∞ est constante. Autrement dit, l'application $u \mapsto u_\infty$ induit un isomorphisme de l'espace $H^{1,p}(G)$ sur le sous-espace, noté $\mathcal{B}^p$, des fonctions g_t-invariantes ayant -1 dérivées dans L^p, modulo les fonctions constantes. En particulier, $T^{1,p}(G) = 0$.
4. On montre que toute fonction de $\mathcal{B}^p$ est invariante à droite par les éléments de G qui sont contractés (au sens large) par $Ad(g_t)$. Or une fonction de norme L^p_{-1} finie ne peut-être invariante à gauche par un sous-groupe distingué non compact de G. On conclut que si $\mathcal{B}^p \neq \{0\}$, $Ad(a_t)$ dilate dans toutes les directions, i.e. que G possède des métriques riemanniennes invariantes à gauche à courbure sectionnelle strictement négative, [He].

1.4 Questions

1. Du théorème 1, il résulte que, parmi les espaces homogènes riemanniens, la classe des espaces homogènes commensurables à un espace à courbure négative est invariante par quasiisométries. Peut-on le voir de façon plus directe ? Par exemple, Y. de Cornulier conjecture que cette classe contient exactement les espaces homogènes riemanniens qui sont hyperboliques au sens de M. Gromov.
2. D'un résultat de N. Lohoué, [L1] (voir aussi [R]), il résulte que, pour les espaces ouverts à l'infini, le fait que la cohomologie réduite soit non nulle, $R^{1,p}(M) \neq 0$, équivaut à l'existence de fonctions harmoniques non constantes dont le gradient est L^p. Le théorème 1 répond donc à la question de l'existence de fonctions harmoniques non constantes dont le gradient est L^p sur les espaces homogènes riemanniens ouverts à l'infini. Dans le cas fermé à l'infini, la question reste ouverte.

1.5 Remerciements

Je suis reconnaissant à Y. Benoist et à Y. de Cornulier pour leur aide au sujet de la structure des groupes de Lie, ainsi qu'à R. Tessera pour l'intérêt qu'il a porté à ce texte, extrait d'un manuscrit ancien non publié, [P4].

2 Réduction aux groupes résolubles

2.1 Invariance sous quasiisométrie

Une application $f : X \to X'$ entre espaces métriques est une *quasiisométrie* s'il existe des constantes L et D telles que tout point de X' est à distance au plus D de l'image de f, et pour tous x, $y \in X$,

$$-D + \frac{1}{L} d^X(x,y) \leq d^{X'}(f(x), f(y)) \leq L\, d^X(x,y) + D.$$

Lemme 4 *Deux espaces homogènes riemanniens connexes commensurables sont quasiisométriques.*

Preuve. Soit G un groupe de Lie connexe, soit $H \subset G$ un sous-groupe compact. Montrons que les espaces homogènes G et $M = G/H$ sont quasiisométriques.

Choisissons un supplémentaire ad_H-invariant U de l'algèbre de Lie $\mathcal{H}$ dans $\mathcal{G}$ et une structure euclidienne ad_H-invariante g_U sur U. Cela détermine une métrique riemannienne G-invariante sur M. Soit $g_{\mathcal{H}}$ une structure euclidienne sur $\mathcal{H}$. La métrique euclidienne $g_{\mathcal{H}} \oplus g_U$ sur $\mathcal{G}$ détermine une métrique riemannienne invariante à gauche sur G, invariante par l'action à droite de H. Pour cette métrique, l'application $f : G \mapsto G/H$ est une submersion riemannienne, i.e. isométrique orthogonalement aux fibres. Par conséquent, f diminue les distances.

Inversement, étant donné un point $g \in G$, toute courbe dans $M = G/K$ d'origine $f(g)$ a un unique relèvement en une courbe d'origine g dans G partout orthogonale aux fibres, et le relèvement prélève la longueur. Par conséquent, la distance entre deux fibres $f^{-1}(x)$ et $f^{-1}(x')$ est égale à $d^M(x, x')$. Enfin, par invariance à gauche, toutes les fibres sont isométriques de même diamètre D. Par conséquent, pour tous g, $g' \in G$, $d^M(f(g), f(g')) \geq d^G(g, g') - D$. Ceci montre que f est une quasiisométrie, et M est quasiisométrique à G.

Lorsque H est compact et distingué dans G, l'action de G sur G/H passe au quotient en l'action de $G' = G/H$ sur lui-même par translation à gauche, donc les métriques G-invariantes sur G/H coïncident avec les métriques invariantes à gauche sur G'. On conclut que G et G' sont quasiisométriques.

Soit maintenant G un groupe de Lie connexe et H un sous-groupe fermé connexe cocompact de G. Montrons que G et H (munis de métriques riemanniennes invariantes à gauche) sont quasiisométriques.

Montrons d'abord par l'absurde qu'il existe une constante D telle que $d^G(g, H) \leq D$ pour tout $g \in G$. Sinon, il existe une suite g_j telle que $d^G(g_j, H)$ tend vers $+\infty$. L'espace des classes à gauche $H \setminus G$ est lui aussi compact. Il existe donc une suite $h_j \in H$ telle que la suite $h_j^{-1} g_j$ converge dans G. Les distances $d^G(h_j, g_j) = d^G(h_j^{-1} g_j, 1)$ sont bornées, et $d^G(g_j, H) \leq d^G(h_j, g_j)$ l'est aussi, contradiction.

Soient h, $h' \in H$. Alors $\delta = d^G(h, h') \leq d^H(h, h')$. Il reste à montrer l'inégalité inverse. Soit $\gamma : [0, \delta] \to G$ une géodésique minimisante de h à h'. Pour $i = 0, \ldots, N = [\delta/D]$, posons $g_i = \gamma(iD)$, de sorte que $d^G(g_i, g_{i+1}) \leq D$ et $ND \leq \delta \leq (N+1)D$. Choisissons $h_i \in H$ tel que $d^G(h_i, g_i) \leq D$. Comme H est fermé dans G, l'intersection de H et de la boule de rayon $3D$ de G est compacte, donc contenue dans une boule de rayon D' pour la métrique de H. Pour tout i, $d^G(h_i^{-1} h_{i+1}, 1) \leq 3D$, donc $d^H(h_i^{-1} h_{i+1}, 1) \leq D'$. Par conséquent,

$$d^H(h, h') \leq \sum d^H(h_i^{-1} h_{i+1}, 1) \leq (N+1)D' \leq \frac{D'}{D} d^G(h, h') + D. \text{ q.e.d.}$$

Proposition 5 *Soit M un espace homogène riemannien connexe et non compact. Alors toute forme fermée L^p sur M est exacte.*

Preuve. Soit M un espace homogène riemannien connexe et non compact. La composante neutre G du groupe d'isométries de M est transitive sur M. Soit ω une forme L^p fermée non exacte sur M. Alors il existe une boule B de M telle que la restriction de ω à B ne soit pas exacte.

Lorsque g varie dans G, les formes $g^*\omega$ sont deux à deux cohomologues. Par conséquent la classe de cohomologie $c \in H^k(B, \mathbf{R})$ de la restriction de $g^*\omega$ à B est indépendante de $g \in G$. Comme B est compacte, la cohomologie L^p de B coïncide avec sa cohomologie de de Rham ordinaire. En particulier, la différentielle extérieure d agissant sur les formes différentielles L^p (et à différentielle L^p) sur B a une image fermée, et il existe une constante $\epsilon > 0$ telle que toute forme fermée représentant la classe c soit de norme L^p supérieure à ϵ. Par conséquent $\| \omega \|_{L^p(gB)} = \| g^*\omega \|_{L^p(B)} \geq \epsilon$. C'est incompatible avec l'hypothèse $\omega \in L^p(M)$. q.e.d.

Corollaire 6 *$H^{1,p}$, $T^{1,p}$ et $R^{1,p}$ sont des invariants de commensurabilité pour les espaces homogènes riemanniens connexes non compacts.*

Preuve. Il est classique ([G, BP]) que, dans la catégorie des variétés riemanniennes à géométrie bornée, la cohomologie L^p *exacte* en degré 1 est un invariant de quasiisométrie (l'énoncé précis se trouve dans [P3]). C'est donc un invariant de commensurabilité. q.e.d.

2.2 Réduction aux groupes résolubles

Lemme 7 *Notons T_n le groupe des matrices triangulaires réelles de taille n. Tout espace homogène riemannien connexe est commensurable à un sous-groupe fermé connexe de T_n, pour un n assez grand.*

Preuve. Soit $M = \breve{G}/\breve{H}$ un espace homogène riemannien connexe. Alors les orbites dans M de l'action de la composante neutre G de $\breve{G}$ sont ouvertes, donc elles sont fermées. Comme M est connexe, il n'y en a qu'une, et on peut écrire $M = G/H$ où $H = \breve{H} \cap G$ est compact. Par définition, M est commensurable à G.

Soit $G = RS$ la décomposition de Levi du groupe G, où R est le radical de G et S est semi-simple ([B] chap. 3 page 244). Supposons d'abord que le centre de S est fini. Soit $S = NAK$ la décomposition d'Iwasawa de S. Comme le centre de S est fini, le groupe K est compact. Alors $G' = RNA$ est résoluble et connexe, $G/G' = G/RNA = S/NA$ est compact, donc G et G' sont commensurables.

Dans le cas général, une construction supplémentaire permet de se débarrasser du centre de S. L'image de S dans le groupe des automorphismes de l'algèbre de Lie de R est un groupe de Lie semi-simple connexe linéaire, donc son centre est fini. Par conséquent, il existe un sous-groupe abélien libre Γ d'indice fini dans le centre de S qui agit trivialement sur R. Γ est donc contenu dans le centre de G. Posons $C = \Gamma \otimes \mathbf{R}$ et $G'' = (G \times C)/\Gamma$ où Γ agit diagonalement par translation. Comme $G \times C$ est connexe, G'' l'est aussi. Comme G''/G, homéomorphe à C/Γ, est compact, G est cocompact dans G'', donc G est commensurable à G''.

La projection sur le premier facteur passe au quotient en $\pi : G'' \to \overline{G} =: G/\Gamma$. Le noyau de π est isomorphe à C donc connexe. Soit $\overline{S} = S/\Gamma$ et $\overline{R} = R/\Gamma \cap R$. Ces sous-groupes de $\overline{G}$ engendrent $\overline{G}$. Soit $\overline{S} = NAK$ la décomposition d'Iwasawa de $\overline{S}$. A nouveau, comme le centre de $\overline{S}$ est fini, le groupe K est compact. Alors $G' = \pi^{-1}(RNA)$ est résoluble et connexe, $G''/G' = \overline{G}/\overline{R}NA = \overline{S}/NA$ est compact, donc G'' (et donc G) est commensurable à G'.

D'après le Lemme 2.4 de [C], G' est isomorphe à un sous-groupe fermé cocompact d'un groupe H qui possède un sous-groupe fermé connexe cocompact T qui se plonge proprement dans l'un des groupes T_n. Autrement dit, G' est commensurable à l'image de T dans T_n, qui est fermée. q.e.d.

3 Torsion et inégalité isopérimétrique

Proposition 8 *Soit M une variété riemannienne de volume infini. Soit $p \geq 1$. La torsion $T^{1,p}(M)$ est nulle si et seulement si l'inégalité de Sobolev suivante est vraie. Il existe une constante telle que, pour toute fonction $u \in L^p(M)$ telle que $du \in L^p(M)$,*

$$\| u \|_{L^p} \leq const. \| du \|_{L^p}.$$

Preuve. Notons $\Omega^{0,p}(M)$ l'ensemble des fonctions L^p à gradient L^p, muni de la norme $\| u \|_{\Omega^{0,p}} = \| u \|_{L^p} + \| du \|_{L^p}$. Notons $\Omega^{1,p}(M)$ l'espace des 1-formes L^p sur M. Ce sont des espaces de Banach, et $d : \Omega^{0,p} \to \Omega^{1,p}$ est borné.

Supposons l'inégalité de Sobolev vraie. Soit α une 1-forme L^p dont la classe de cohomologie appartient à $T^{1,p}(M)$. Soit u_j une suite de fonctions L^p sur M telle que $du_j \in L^p$ et du_j converge vers α dans L^p. D'après l'inégalité de Sobolev, la suite u_j est bornée dans L^p. Extrayons une sous-suite qui converge faiblement vers u_∞. Alors $u_\infty \in L^p$ et $du_\infty = \alpha$, donc la classe de cohomologie L^p de α est nulle. On conclut que $T^{1,p}(M) = 0$.

Inversement, supposons que $T^{1,p}(M) = 0$. Alors $d\Omega^{0,p}(M)$ est fermé dans $\Omega^{1,p}(M)$, donc c'est un espace de Banach. Comme M est de volume infini, les fonctions constantes ne sont pas L^p, donc d est injectif. L'opérateur d induit $\overline{d} : \Omega^{0,p}(M) \to d\Omega^{0,p}(M)$. C'est une bijection continue entre espaces de Banach, donc un isomorphisme. Par conséquent, il existe une constante telle que pour tout $u \in \Omega^{0,p}(M)$, $\| u \|_{\Omega^{0,p}} \leq \text{const.} \| du \|_{L^p}$. q.e.d.

Définition 9 *Une variété riemannienne M est dite* ouverte à l'infini *si elle satisfait une inégalité isopérimétrique linéaire, i.e. si pour toute sous-variété compacte Δ de codimension* 0*, à bord lisse,*

$$\mathrm{Vol}\,\Delta \leq const.\mathrm{Vol}\,\partial\Delta.$$

Si M n'est pas ouverte à l'infini, elle est fermée à l'infini.

Proposition 10 *Soit M une variété riemannienne à géométrie bornée. Les propriétés suivantes sont équivalentes.*

1. *M est ouverte à l'infini ;*
2. *pour tout $p \geq 1$, $T^{1,p}(M) = 0$;*
3. *il existe $p \geq 1$ tel que $T^{1,p}(M) = 0$.*

Preuve. Lorsque $p = 2$, ces équivalences sont essentiellement dues à R. Brooks, [Br]. Elles apparaissent pour la première fois dans le contexte des marches aléatoires sur les groupes, [K].

Il est classique (voir [Ma]) que l'inégalité isopérimétrique $\mathrm{Vol}\,\Delta \leq \mathrm{const.Vol}\,\partial\Delta$ est équivalente à l'inégalité de Sobolev L^1 (avec la même constante) : pour toute fonction u lisse à support compact sur M, $\| \phi \|_{L^1} \leq \mathrm{const.}\| du \|_{L^1}$.

L'inégalité de Sobolev L^1, appliquée à la fonction u^p, combinée à l'inégalité de Hölder, entraîne l'inégalité de Sobolev L^p pour $p \geq 1$. Ceci prouve que (1) $\Rightarrow$ (2).

Il reste à montrer que, sous l'hypothèse de géométrie bornée, l'inégalité de Sobolev L^p pour un $p > 1$ entraîne l'inégalité de Sobolev L^1. Par invariance par quasiisométrie, on peut remplacer M par un graphe X de valence bornée par V et dont les arêtes ont toutes même longueur. Les fonctions sur M deviennent des fonctions sur l'ensemble X^0 des sommets de X et la norme L^p de la différentielle devient $(\sum |u(a) - u(b)|^p)^{1/p}$ où la somme est étendue aux couples de sommets reliés par une arête.

Supposons d'abord que u ne prend que les valeurs 0 et 1. Alors $\| u \|_{L^p} = \| u \|_{L^1}^{1/p}$ et $\| du \|_{L^1} = \| du \|_{L^1}^{1/p}$ donc l'inégalité de Sobolev L^p entraîne l'inégalité de Sobolev L^1 dans ce cas.

Enfin, on écrit une fonction quelconque comme intégrale de fonctions à valeurs dans $\{0, 1\}$. Soit u une fonction sur X^0. Quitte à remplacer u par sa valeur absolue (ce qui ne change pas la norme L^1 et diminue la norme L^1 de la différentielle), on peut supposer que u est positive ou nulle. On écrit alors $u = \displaystyle\int_0^{+\infty} u_t\, dt$ où $u_t(x) = 1$ si $u(x) \geq t$ et $u_t(x) = 0$ sinon. Alors

$$\| u \|_{L^1} = \int_0^{+\infty} \| u_t \|_{L^1}\, dt$$

et

$$\| du \|_{L^1} = \int_0^{+\infty} \| du_t \|_{L^1}\, dt,$$

donc l'inégalité de Sobolev L^p entraîne l'inégalité de Sobolev L^1 en général. q.e.d.

Proposition 11 (H. Hoke, [Ho]). *Soit G un groupe de Lie muni d'une métrique riemannienne invariante à gauche. Alors G est fermé à l'infini si et seulement si G est moyennable (i.e. extension d'un groupe résoluble par un groupe compact) et unimodulaire.*

Corollaire 12 *Soit G un groupe de Lie. Si G est moyennable unimodulaire, alors pour tout $p > 1$, $T^{1,p}(G) \neq 0$. Inversement, s'il existe $p > 1$ tel que $T^{1,p}(G) \neq 0$, alors G est moyennable unimodulaire.*

4 Valeur au bord

Soit G un groupe de Lie non unimodulaire muni d'une métrique invariante à gauche, soit $\mathcal{G}$ son algèbre de Lie. La forme linéaire $\xi \mapsto \operatorname{tr} ad_\xi$ sur $\mathcal{G}$ n'est pas nulle. Choisissons $\xi_0 \in \mathcal{G}$ tel que $\tau = \operatorname{tr} ad_{\xi_0} > 0$. Notons $\phi_t = R_{\exp(t\xi_0)}$ la translation à droite par $\exp(t\xi_0)$. C'est le flot de ξ_0 vu comme champ de vecteurs invariant à gauche sur G, donc il multiplie les volumes par $e^{t\tau}$. Alors, pour toute fonction u sur G dont le gradient est L^p et tout $t \in \mathbf{R}$,

$$\begin{aligned} \left\| \frac{d}{dt} u \circ \phi_t \right\|_{L^p} &= \| (\xi_0 u) \circ \phi_t \|_{L^p} \\ &= e^{-t\tau/p} \| \xi_0 u \|_{L^p} \\ &\leq \text{const.}\, e^{-t\tau/p} \| du \|_{L^p}, \end{aligned}$$

où la constante est la norme (constante) de ξ_0. Comme $\tau/p > 0$, l'application $t \mapsto u \circ \phi_t - u$ converge dans $L^p(G)$ quand t tend vers $+\infty$. En particulier, $u \circ \phi_t$ converge presque partout.

Définition 13 *Soit u une fonction sur G dont le gradient est L^p. On appelle* valeur au bord *de u, et on note u_∞ la limite des translatées $u \circ R_{\exp(t\xi_0)} = u \circ \phi_t$, quand t tend vers $+\infty$.*

Le terme valeur au bord s'inspire du cas de la courbure strictement négative. Lorsque G possède une métrique riemannienne invariante à gauche à courbure sectionnelle négative, les orbites de ξ_0 convergent en $-\infty$ vers un même point du bord à l'infini, et en $+\infty$ vers tous les autres points du bord.

On va montrer qu'une fonction sur G dont le gradient est L^p satisfait l'inégalité de Sobolev dès que sa valeur au bord est presque partout nulle. Cette idée est due à R. Strichartz, [S], voir aussi [GKS].

4.1 Les espaces $(L^p + dL^p)(G)$ et $d^{-1}dL^p(G)$

Dans cette section, on précise la régularité de la valeur au bord. Soit u une fonction sur G dont le gradient est L^p. Par construction, $v = u_\infty - u \in L^p$, donc du_∞ est la somme d'une 1-forme L^p et de la différentielle d'une fonction L^p. Cela suggère la définition suivante.

Définition 14 *Soit α une 1-forme (à coefficients distributions) sur G, on pose*

$$\| \alpha \|_{(L^p+dL^p)(G)} = \inf\{\| \beta \|_{L^p} + \| \gamma \|_{L^p} \mid \beta \text{ 1-forme, } \gamma \text{ fonction, } \alpha = \beta + d\gamma\}.$$

On va exprimer cette norme sous une forme plus commode, à l'aide de la définition suivante.

Définition 15 *Soit B une boule de rayon 1 de G. Soit f une fonction sur B. On pose*

$$\| f \|_{d^{-1}dL^p(B)} = \inf_{c \in \mathbf{R}} \| f - c \|_{L^p(B)}.$$

Pour une fonction f localement L^p sur G, on pose

$$\| f \|^p_{d^{-1}dL^p(G)} = \int_G \| f_{|gB} \|^p_{d^{-1}dL^p(gB)}\, dg.$$

Autrement dit, une fonction est de classe $d^{-1}dL^p$ si sa dérivée est localement la dérivée d'une fonction L^p, et si la fonction "meilleure norme L^p d'une primitive locale" est elle-même L^p sur G tout entier.

Lemme 16 *Soit w une fonction sur G. Alors w appartient à $d^{-1}dL^p(G)$ si et seulement si dw appartient à $(L^p + dL^p)(G)$.*

Preuve. Si f est une fonction L^p sur G, alors pour toute boule de rayon 1, $\| f_{|B} \|_{d^{-1}dL^p(B)} \leq \| f_{|B} \|_{L^p(B)}$, d'où, en intégrant sur toutes les boules, $\| f \|_{d^{-1}dL^p(G)} \leq \| f \|_{L^p}$.

Soit f une fonction sur G dont la différentielle est L^p. D'après l'inégalité de Poincaré, il existe pour chaque boule B une constante $c_{f,B}$ telle que

$$\| f - c_{f,B} \|_{L^p(B)} \leq \text{const.} \| df \|_{L^p(B)}.$$

En intégrant sur toutes les boules de rayon 1, il vient $\| f \|_{d^{-1}dL^p(G)} \leq \text{const.} \| df \|_{L^p}$.

Soit w une fonction telle que $dw = \beta + d\gamma \in (L^p + dL^p)(G)$. Alors $w - \gamma$ a une différentielle L^p, donc elle appartient à $d^{-1}dL^p(G)$, d'où $w = w - \gamma + \gamma \in d^{-1}dL^p(G)$.

Réciproquement, si $w \in d^{-1}dL^p(G)$, construisons une fonction lisse, qui diffère de w d'une fonction L^p, et dont la différentielle est L^p. Pour cela, il suffit de régulariser w. Soit ψ une fonction lisse, positive ou nulle, à support compact dans la boule unité B de G, d'intégrale 1. Soit u le produit de convolution $u = w \star \psi$. Alors u est lisse. Comme, pour toute constante c, $du = (w - c) \star d\psi$ est une combinaison linéaire de valeurs de $w - c$, pour tout $g \in G$,

$$\| du \|_{L^p(gB)} \leq \text{const.} \inf_{c \in \mathbf{R}} \| w - c \|_{L^p(gB)} \leq \text{const.} \| dw \|_{d^{-1}dL^p(gB)},$$

d'où, en intégrant par rapport à g, $du \in L^p(G)$. De même, pour toute constante c, $u - w = (w - c) \star (\psi - \delta)$, où δ est la masse de Dirac à l'origine, donc pour tout $g \in G$,

$$\| u - w \|_{L^p(gB)} \leq \text{const.} \inf_{c} \| w - c \|_{L^p(gB)} \leq \text{const.} \| dw \|_{d^{-1}dL^p(gB)},$$

d'où $u - w \in L^p(G)$. Cela prouve que $dw \in (L^p + dL^p)(G)$. q.e.d.

4.2 Image de l'application valeur au bord

Définition 17 *Soit G un groupe de Lie non unimodulaire. Soit $\xi_0 \in \mathcal{G}$ un champ de vecteurs invariant à gauche de divergence strictement positive. On note*

$$\mathcal{B}^p_{\xi_0} = \{ w \in d^{-1}dL^p(G) \,|\, w \circ R_{\exp(t\xi_0)} = w \text{ presque partout, pour tout } t \},$$

Proposition 18 *Soit G un groupe de Lie non unimodulaire. On choisit un vecteur $\xi_0 \in \mathcal{G}$ de divergence positive, pour définir des valeurs au bord. Alors l'application $u \mapsto u_\infty$ passe au quotient en une injection $H^{1,p}(G) \to d^{-1}dL^p(G)$ mod $\mathbf{R}$, dont l'image est exactement $\mathcal{B}^p_{\xi_0}$ mod $\mathbf{R}$, i.e. modulo les constantes additives.*

De façon équivalente, l'application $du \mapsto du_\infty$ passe au quotient en une injection $H^{1,p}(G) \to (L^p + dL^p)(G)$, dont l'image est le sous-espace

$$d\mathcal{B}^p_{\xi_0} = \{ \alpha \in (L^p + dL^p)(G) \,|\, d\alpha = 0 \text{ et } \alpha(\xi_0) = 0 \text{ au sens des distributions} \}.$$

Preuve. Les valeurs au bord u_∞ sont des fonctions ϕ_t-invariantes. Par construction, leur différentielle appartient à $L^p + dL^p$. D'après le lemme 16, $u_\infty \in d^{-1}dL^p$, donc $u \in \mathcal{B}^p_{\xi_0}$.

Si $u \in L^p$, $\| u \circ \phi_t \|_{L^p} = e^{-t\tau/p} \| u \|_{L^p}$ tend vers 0 quand t tend vers $+\infty$, donc $u_\infty = 0$. Si u est constante, u_∞ l'est aussi. Par conséquent, l'opérateur valeur au bord, à constante additive près, passe au quotient. Si u_∞ est constante, comme $u - u_\infty \in L^p$, la classe de cohomologie de du est nulle. Par conséquent, l'opérateur valeur au bord est injectif.

Soit α une 1-forme fermée de $(L^p + dL^p)(G)$, telle que $\alpha(\xi_0) = 0$ au sens des distributions. Par hypothèse, il existe une 1-forme L^p β et une fonction L^p γ telles que $\alpha = \beta + d\gamma$. Nécessairement, $d\beta = 0$, donc, avec le lemme 5, $\beta = du$ où la fonction u a un gradient L^p. Soit $w = u + \gamma$. Alors $dw = \alpha$, sa dérivée au sens des distributions le long des orbites de ξ_0 s'annule, donc w est ϕ_t-invariante. Comme γ est L^p, les fonctions $\gamma \circ \phi_t$ tendent vers 0 dans L^p quand t tend vers $+\infty$, donc w est la valeur au bord de u. On conclut que l'image de l'opérateur valeur au bord est exactement $\mathcal{B}^p_{\xi_0}$ modulo les constantes. q.e.d.

4.3 Restrictions sur les valeurs au bord

Une métrique invariante à gauche sur un groupe de Lie G croît exponentiellement avec des taux différents suivant les directions. Cela entraîne des restrictions sur les fonctions de $d^{-1}dL^p(G)$ invariantes à droite par un sous-groupe à un paramètre.

Lemme 19 *Soit G un groupe de Lie non unimodulaire, soit $\xi_0 \in \mathcal{G}$ de divergence $\operatorname{tr} ad_{\xi_0}$ strictement positive. Pour toute fonction $w \in \mathcal{B}^p_{\xi_0}$, la différentielle au sens des distributions dw s'annule sur tous les sous-espaces caractéristiques de ad_{ξ_0} relatifs à des valeurs propres de parties réelles strictement inférieures à $\dfrac{\operatorname{tr} ad_{\xi_0}}{p}$.*

Preuve. On écrit $w = u + v$ où $v \in L^p(G)$ et $du \in L^p$. Comme w est ϕ_t invariante, $w = u \circ \phi_t + v \circ \phi_t$. Or $v \circ \phi_t$ tend vers 0 quand t tend vers $+\infty$. Par conséquent,

$$dw = \lim_{t \to +\infty} d(u \circ \phi_t) = \lim_{t \to +\infty} \phi_t^* du$$

au sens des distributions.

On voit du comme une fonction $G \mapsto \mathcal{G}^*$ et les éléments de $\mathcal{G}$ comme des champs de vecteurs invariants à gauche. Soit $\eta \in \mathcal{G} \otimes \mathbf{C}$. Alors, en tout point de G,

$$\langle \phi_t^* du, \eta \rangle \quad = \quad \langle du \circ \phi_t, ad_{\exp(t\xi_0)}(\eta) \rangle$$

Soit $\lambda \in \mathbf{C}$ une valeur propre de ad_{ξ_0}. Supposons que $\eta \in \ker (ad_{\xi_0} - \lambda\, I)^\ell \subset \mathcal{G}$ appartient à l'espace caractéristique relatif à λ. Alors

$$\exp(t\, ad_{\xi_0})(\eta) = e^{t\lambda} P(t),$$

où P est un polynôme en t à valeurs dans $\mathcal{G}$. Comme les fonctions $du \circ \phi_t$ tendent vers 0 exponentiellement vite dans L^p, $\| du \circ \phi_t \|_{L^p} \leq e^{-t \operatorname{tr} ad_{\xi_0}/p}$, il vient

$$\begin{aligned} \| \langle \phi_t^* du, \eta \rangle \|_{L^p} &= \| e^{t\lambda} \langle du \circ \phi_t, P(t) \rangle \|_{L^p} \\ &\leq e^{t(\Re e(\lambda) - \operatorname{tr} ad_{\xi_0}/p)} |P(t)|. \end{aligned}$$

Si $\Re e(\lambda) < \operatorname{tr} ad_{\xi_0}/p$, $\langle \phi_t^* du, \eta \rangle$ tend vers 0 quand t tend vers $+\infty$, et on conclut que $\langle dw, \eta \rangle = 0$. q.e.d.

On aura besoin aussi du cas limite du lemme 19.

Lemme 20 *Soit G un groupe de Lie connexe. Soit $\xi \in \mathcal{G}$ un champ de vecteurs invariant à gauche. On suppose que le sous-groupe à un paramètre $A = \{\exp(t\xi) \,|\, t \in \mathbf{R}\}$ est fermé dans G. Soit $w \in d^{-1}dL^p(G)$ une fonction A-invariante à droite. Alors la différentielle au sens des distributions dw s'annule sur les sous-espaces propres de ad_{ξ_0} relatifs aux valeurs propres de partie réelle égale à $\dfrac{\operatorname{tr} ad_\xi}{p}$. En particulier, si $\operatorname{tr} ad_\xi = 0$ et si $[\xi, \eta] = 0$, alors $\langle dw, \eta \rangle = 0$.*

Preuve. Comme A est fermé dans G, $\phi_t = R_{\exp(t\xi)}$ définit une action propre de $\mathbf{R}$ sur G.

Soit $w \in d^{-1}dL^p(G)$ une fonction A-invariante à droite. De nouveau, on l'écrit $w = u + v$ avec $v \in L^p$ et $du \in L^p$. Dans le cas où $\operatorname{tr} ad_\xi = 0$, il n'est plus vrai que les $v \circ \phi_t$ tendent vers 0 dans L^p, mais on peut quand même affirmer qu'il existe une sous-suite t_j tendant vers $+\infty$ telle que $v \circ \phi_{t_j}$ tend vers 0 au sens des distributions. En effet, dans ce cas, ϕ_t préserve la mesure et agit proprement sur G. Pour tout compact K de G, il existe une sous-suite t_j tendant vers $+\infty$ telle que les $\phi_{t_j}(K)$ soient deux à deux disjoints. Comme la suite $(\| v \|_{L^p(\phi_{t_j}(K))})_j$ est ℓ^p, elle tend vers 0. Cela prouve que les $v \circ \phi_{t_j}$ tendent vers 0 dans $L^p(K)$.

Une variante de ce raisonnement s'applique à la fonction $v' = |\langle du, \eta\rangle|$, lorsque η est un vecteur propre de ad_ξ relatif à une valeur propre λ telle que $\Re e(\lambda) = \operatorname{tr} ad_\xi/p$. Comme $v' \in L^p$, on peut supposer que les intégrales $\int_{\phi_{t_j}(K)} v'^p$ tendent vers 0. Or

$$\int_{\phi_{t_j}(K)} v'^p = \int_K |\langle \phi_{t_j}^* du, \eta\rangle|^p.$$

Par conséquent, $\langle \phi_{t_j}^* du, \eta\rangle$ tend vers 0 au sens des distributions. Cela suffit pour conclure que $\langle dw, \eta\rangle = 0$. q.e.d.

Une fonction L^p sur un groupe de Lie G ne peut être invariante par un sous-groupe unimodulaire non compact. Il en est de même pour une fonction de $d^{-1}dL^p(G)$.

Lemme 21 *Soit G un groupe de Lie. Soit $w \in d^{-1}dL^p(G)$. Si w est invariante par un sous-groupe fermé distingué unimodulaire non compact de G, alors w est constante.*

Preuve. Comme H est distingué, toute fonction H-invariante à droite est aussi H-ionvariante à gauche. Comme H est fermé, distingué et unimodulaire, la mesure de Haar de G se désintègre le long des orbites de H, par rapport à une mesure de Haar de G/H, [W]. Si w est H-invariante, la fonction $g \mapsto I(g) = \| w \|^p_{d^{-1}dL^p(gB)}$ est aussi H-invariante, elle passe au quotient en une fonction J sur G/H, et son intégrale sur G vaut

$$\| w \|^p_{d^{-1}dL^p(G)} = vol(H) \int_{G/H} J(\bar{g})\, d\bar{g}.$$

Si H est non compact, son volume est infini, donc $J = 0$, et w est constante. q.e.d.

Corollaire 22 *Soit G un groupe de Lie, $N \subset G$ un sous-groupe fermé nilpotent connexe, simplement connexe, distingué, non trivial. Soit $w \in d^{-1}dL^p(G)$, soit $\xi \in \mathcal{N}$ un champ de vecteurs invariant à gauche non nul. Si, au sens des distributions, $\langle dw, \xi\rangle = 0$, alors w est constante.*

Preuve. Notons A le sous-groupe à un paramètre engendré par ξ. Comme N est nilpotent connexe et simplement connexe, l'exponentielle de N est un difféomorphisme, donc A est fermé dans N et donc dans G. D'autre part, ad_ξ est nilpotent donc $\operatorname{tr} ad_\xi = 0$.

Soit η un vecteur non nul du centre de $\mathcal{N}$. Alors $[\xi, \eta] = 0$. Le lemme 20 donne que $\langle dw, \eta\rangle = 0$. Par conséquent, le centre de N, qui est non compact, fermé et distingué dans G, préserve w. Le lemme 21 s'applique, on conclut que w est constante. q.e.d.

4.4 Cohomologie L^p en degré 1 des groupes de Lie résolubles

Proposition 23 *Soit G un sous-groupe connexe et fermé du groupe des matrices triangulaires réelles. On suppose que G n'est pas unimodulaire et qu'il n'admet pas de métrique invariante à gauche à courbure sectionnelle strictement négative. Alors pour tout $p > 1$, $H^{1,p}(G) = 0$.*

Preuve. D'après [B], chap. 7, pages 19-20, il existe deux sous-groupes nilpotents connexes A et $N \subset G$ tels que $G = AN$, N est fermé, distingué et $[A, A] \subset N$. Notons $\mathcal{A}$ et $\mathcal{N}$ leurs algèbres de Lie. L'algèbre de Lie $\mathcal{G}$ se décompose en sous-espaces caractéristiques pour l'action de l'algèbre de Lie nilpotente $\mathcal{A}$,

$$\mathcal{G} \otimes \mathbf{C} = \bigoplus_{\lambda \in \Sigma} \mathcal{G}_\lambda$$

où les λ sont des formes linéaires sur $\mathcal{A}$ telles que pour $\xi \in \mathcal{A}$, $ad_\xi - \lambda(\xi)I$ restreinte à $\mathcal{G}_\lambda$ soit nilpotente (voir [B], chap. 1, exercice 12 page 127). Comme ad est la restriction de la représentation adjointe de l'algèbre de Lie du groupe T_n, les racines λ sont à valeurs réelles.

Si $\xi \in \mathcal{N}$, ad_ξ est nilpotente sur $\mathcal{N}$ et son image est contenue dans $\mathcal{N}$. Par conséquent, la forme linéaire $\tau : \xi \mapsto \operatorname{tr} ad_\xi$ sur $\mathcal{G}$ est nulle sur $\mathcal{N}$. Comme G n'est pas unimodulaire, τ n'est pas identiquement nulle sur $\mathcal{G}$, donc elle est non nulle sur $\mathcal{A}$.

Supposons que $H^{1,p}(G) \neq 0$. Montrons que pour tout élément $\lambda \in \Sigma$, λ, en tant que forme linéaire sur $\mathcal{A}$, est un multiple positif de τ. Choisissons $\xi_0 \in \mathcal{A}$ tel que $\tau(\xi_0) > 0$. Alors, d'après le lemme 18, si $H^{1,p}(G) \neq 0$, il existe une fonction non constante $w \in \mathcal{B}^p_{\xi_0}$, i.e. $w \in d^{-1}dL^p(G)$ est invariante par le groupe à un paramètre de translations à droite engendré par ξ_0. D'après les lemmes 19 et 20, si $\lambda(\xi_0) \leq \tau(\xi_0)/p$, et si $\eta \in \mathcal{N}$ est un vecteur propre de ad_{ξ_0} relatif à $\lambda(\xi_0)$, alors dw s'annule sur η. Le corollaire 22 entraîne alors que w est constante, contradiction. On a donc montré que, pour tout $\xi_0 \in \mathcal{A}$,

$$\tau(\xi_0) > 0 \Rightarrow \lambda(\xi_0) > \frac{\tau(\xi_0)}{p}.$$

Cela entraîne en particulier que $\tau(\xi_0) > 0 \Leftrightarrow \lambda(\xi_0) > 0$, i.e. que λ est colinéaire à τ, $\lambda = c_\lambda \tau$, où $c_\lambda > \dfrac{1}{p}$.

Pour tout $\xi \in \ker \tau$, ad_ξ est nilpotent, donc l'idéal $\ker \tau$ est nilpotent. On peut donc remplacer la paire $(\mathcal{A}, \mathcal{N})$ par $(\mathbf{R}\xi_0, \ker \tau)$. Autrement dit, on peut supposer que $\dim A = 1$. Les formes linéaires $\lambda \in \Sigma$ ne sont rien de plus que les nombres $\lambda = \lambda(\xi_0)$, et leurs parties réelles sont toutes du même signe. Autrement dit, G est le produit semi-direct d'un groupe de Lie nilpotent simplement connexe N par $\mathbf{R}$ agissant par une dérivation dont les valeurs propres ont une partie réelle strictement positive. Un tel groupe admet une métrique riemannienne invariante à courbure sectionnelle strictement négative, [He]. q.e.d.

Proposition 24 *Soit N un groupe de Lie nilpotent simplement connexe de dimension $n-1$, α une dérivation de $\mathcal{N}$ dont les valeurs propres ont des parties réelles $0 < \lambda_1 \leq \cdots \leq \lambda_{n-1}$ strictement positives. Soit $G = N \rtimes_\alpha \mathbf{R}$. Posons*

$$\mathbf{p}(G) = \frac{\lambda_1 + \cdots + \lambda_{n-1}}{\lambda_1}.$$

Alors $T^{1,p}(G) = 0$ pour tout $p \geq 1$, $R^{1,p}(G) = 0$ si $p \leq \mathbf{p}(G)$ et $R^{1,p}(G) \neq 0$ si $p > \mathbf{p}(G)$.

Preuve. Le résultat apparaît dans [P1] dans le cas particulier où α est semi-simple.

Le champ de vecteurs invariant à gauche ξ_0 engendrant l'action à droite du facteur $\mathbf{R}$ sur le produit semi-direct satisfait $ad_{\xi^0} = \alpha$ sur $\mathcal{N}$, d'où $\operatorname{tr}(ad_{\xi_0}) = \lambda_1 + \cdots + \lambda_{n-1} > 0$. Le lemme 18 s'applique et $H^{1,p}(G) = \mathcal{B}^p_{\xi_0}$ est séparé.

On a vu au paragraphe précédent que si $H^{1,p}(G) \neq 0$, alors les parties réelles λ_i des valeurs propres de ad_{ξ_0} sur $\mathcal{N}$ satisfont toutes $\lambda_i > \dfrac{\operatorname{tr} ad_{\xi_0}}{p} = \dfrac{\lambda_1 + \cdots + \lambda_{n-1}}{p}$, soit $p > \mathbf{p}(G)$.

Inversement, notons $\pi : N \rtimes \mathbf{R} \to N$ la projection sur le second facteur. Si $p > \mathbf{p}(G)$, pour toute fonction lisse $\bar{u}$ à support compact sur N, $\bar{u} \circ \pi$ est dans $\mathcal{B}^p_{\xi_0}$. En effet, soit χ une fonction lisse sur $\mathbf{R}$ qui vaut 0 au voisinage de $-\infty$ et 1 au voisinage de $+\infty$. Le flot ϕ_t de ξ donne un difféomorphisme

$$N \times \mathbf{R} \to G, \quad (n,t) \mapsto \phi_t(n).$$

Posons $u(n,t) = \chi(t)\bar{u}(n)$. Si $p > \mathbf{p}(G)$, $du \in L^p$, $u_\infty = \bar{u} \circ \pi \in \mathcal{B}^p_\xi$. En particulier, $R^{1,p}(G) \neq 0$. q.e.d.

4.5 Preuve du théorème 1

Soit M un espace homogène riemannien connexe non compact. Soit G la composante neutre de son groupe d'isométries. Comme M et G sont quasiisométriques (lemme 4), $T^{1,p}(M) = T^{1,p}(G)$. D'après le corollaire 12, s'il existe $p > 1$ tel que $T^{1,p}(M) \neq 0$, alors G est une extension compacte

d'un groupe de Lie résoluble unimodulaire. Inversement, si G est une extension compacte d'un groupe de Lie résoluble unimodulaire, alors pour tout $p > 1$, $T^{1,p}(M) \neq 0$.

Désormais, nous pouvons supposer que $T^{1,p}(M) = 0$. D'après le lemme 7, M est quasiisométrique à un groupe de Lie résoluble G qui satisfait aux hypothèses de la proposition 23. De nouveau, $T^{1,p}(G) = T^{1,p}(M) = 0$ donc G n'est pas unimodulaire. S'il existe $p > 1$ tel que $H^{1,p}(M) \neq 0$, alors $R^{1,p}(G) \neq 0$. D'après la proposition 23, G admet une métrique invariante à courbure sectionnelle négative, et le détail est donné par la proposition 24. q.e.d.

4.6 Preuve du corollaire 3

Soit M un espace homogène riemannien connexe non compact. L'espace des 1-formes harmoniques L^2 sur M est isomorphe à $R^{1,2}(M)$. J. Cheeger et M. Gromov [CG] ont montré que si M est une variété riemannienne fermée à l'infini qui revêt une variété compacte, alors les nombres de Betti L^2 de M (dimensions de Von Neumann des espaces de cohomologie L^2) sont tous nuls. En particulier, $R^{1,2}(M) = 0$. Le même argument, fondé sur la dimension de von Neumann, s'étend sans changement au cas des groupes de Lie fermés à l'infini. Par invariance sous quasiisométrie (lemme 4 et corollaire 6), on a donc $R^{1,2}(M) = 0$ pour tout espace homogène riemannien fermé à l'infini.

D'après le théorème 1, si $R^{1,2}(M) \neq 0$, M est commensurable à un espace homogène M' à courbure sectionnelle strictement négative, et tel que $\mathbf{p}(M') < 2$. L'expression donnée par la proposition 24 montre que cela n'est possible que si $\dim M' = 2$. q.e.d.

Références

[B] N. BOURBAKI, *Groupes et algèbres de Lie.* Eléments de Mathématique, Masson, Paris (1981).

[Bo] A. BOREL, *The L^2-cohomology of negatively curved Riemannian symmetric spaces.* Ann. Acad. Sci. Fennicae **10**, 95 – 105 (1985).

[BP] M. BOURDON, H. PAJOT, *Cohomologie L^p et espaces de Besov.* J. Reine Angew. Math. **558**, 85 – 108 (2003).

[Br] R. BROOKS, *The fundamental group and the spectrum of the Laplacian.* Comment. Math. Helv. **56**, 581 – 598 (1981).

[C] Y. DE CORNULIER, *Dimension of asymptotic cones of Lie groups.* Prépublication. Université de Rennes (2007).

[CG] J. CHEEGER, M. GROMOV, *L^2 cohomology and group cohomology.* Topology **25**, 189 – 215 (1986).

[G] M. GROMOV, *Asymptotic invariants of infinite groups.* In "Geometric Group Theory", ed. G. Niblo and M. Roller, Cambridge University Press, Cambridge (1993).

[GKS] V. GOLDSTEIN, V. KUZMINOV, I. SHVEDOV, *The Kuenneth formula for L_p cohomologies of warped products.* Sib. Math. J. **32**, No.5, 749 – 760 (1991) ; translation from Sib. Mat. Zh. **32**, No.5(189), 29 – 42 (1991).

[He] E. HEINTZE, *On homogeneous manifolds of negative curvature.* Math. Annalen **211**, 23 – 34 (1974).

[Ho] H. HOKE, *Lie groups that are closed at infinity.* Trans. Amer. Math. Soc. **313**, 721 – 735 (1989).

[K] H. KESTEN, *Full Banach mean values on countable groups.* Math. Scand. **7**, 146 – 156 (1959).

[L1] N. LOHOUE, *Remarques sur un théorème de Strichartz.* C. R. Acad. Sci., Paris, Ser. I **311**, 507 – 510 (1990).

[Ma] V. MAZYA, *Classes of domains and embedding theorems for function spaces.* Dokl. Akad. Nauk USSR **133**, 527 – 530 (1960).

[P1] P. PANSU, *Cohomologie L^p des variétés à courbure négative, cas du degré un.* In "P.D.E. and Geometry 1988", Rend. Sem. Mat. Torino, Fasc. spez., $95-120$ (1989).

[P2] P. PANSU, *Dimension conforme et sphère à l'infini des variétés à courbure négative.* Ann. Acad. Sci. Fenn., Ser. A I **14**, $177-212$ (1989).

[P3] P. PANSU, *Cohomologie L^p : invariance sous quasiisométrie.* Manuscrit (1995).

[P4] P. PANSU, *Cohomologie L^p, espaces homogènes et pincement.* Texte disponible à la page `http://www.math.u-psud.fr/%7Epansu/liste-prepub.html` depuis (1999).

[R] D. ALEXANDRU-RUGINA, *L_p-intégrabilité des formes harmoniques K-finies sur les espaces hyperboliques réels et complexes.* Rend. Semin. Mat., Torino **54**, $75-87$ (1996).

[S] R. STRICHARTZ, *Analysis of the Laplacian on a complete Riemannian manifold.* J. Funct. Anal. **52**, $48-79$ (1983).

[Te] R. TESSERA, *Vanishing of the first reduced cohomology with values in an L^p-representation.* Preprint, Université de Cergy-Pontoise, (2006).

[T] H. TRIEBEL, *Theory of function spaces II.* Birkhaüser, Basel (1992).

[W] A. WEIL, *L'intégration dans les groupes topologiques et ses applications.* Actual. sci. et indus. **869**. Paris : Hermann (1940).

Univ Paris-Sud, Laboratoire de Mathématiques d'Orsay, Orsay Cedex, F-91405 ;
CNRS, Orsay cedex, F-91405
`Pierre.Pansu@math.u-psud.fr`

`http://www.math.u-psud.fr/~pansu`